作物の種類		ピーマン		70(08007)	1次必須項目									
項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	葉長	10株	測定	cm (小数第2位を四捨五入)										最大葉の葉身基部から葉先まで
2	早晩性	10株	観察		極早	より早	早	やや早	中	やや晩	晩	より晩	極晩	第1花の平均開花期
3	分枝角度	10株	測定	度 (小数第1位を四捨五入)										第1花着生部の分枝角度
4	完熟果長	10株	測定	cm (小数第2位を四捨五入)										代表的な果実 (完熟期) の肩部から果頂部まで
5	果型指数	10果	測定	* (小数第3位を四捨五入)										代表的な果実 (完熟期) の果長/最大果径
6	果頂部の形	10果	観察		尖		丸		凹					代表的な果実, 果頂部の形
7	こうあ部のくぼみ	10果	観察	無	極浅	より浅	浅	やや浅	中	やや深	深	より深	極深	代表的な果実のこうあ部のくぼみ程度
8	未熟果色	10果	観察		黄	淡緑	緑	濃緑	帯紫					代表的な果実 (収穫果) の色
9	果の着生方向	10果	観察			より下向	下向	やや下向	中間	やや上向	上向	より上向		代表的な果実の着生方向
10	果面シワの多少	10果	観察	無	極少	より少	少	やや少	中	やや多	多	より多	極多	代表的な果実の果面シワの多少

作物の種類		ピーマン		70(08007)	1次選択項目									
項目番号	項目名	調査数	方法	分 級 ・ 単 位									調 査 方 法 等	
				0	1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	草丈	10株	測定	cm (小数第1位を四捨五入)									採種期の草丈	
2	分枝性	10株	観察		極粗	より粗	粗	やや粗	中	やや密	密	より密	極密	区の代表的分枝性
3	第1分枝の節位	10株	測定	枚 (小数第1位を四捨五入)									第1分枝までの本葉数	
4	主枝の太さ	10株	測定	mm (小数第2位を四捨五入)									第3~5分枝間の主枝の太さ	
5	節間長	10株	測定	cm (小数第2位を四捨五入)									第3~5分枝の節間長	
6	枝の強度	10株	観察		極弱	より弱	弱	やや弱	中	やや強	強	より強	極強	代表的な枝の強度
7	腋芽の発生	10株	観察	無	極少	より少	少	やや少	中	やや多	多	より多	極多	代表的な第1分枝以下の腋芽の数
8	葉色	10株	観察		極淡緑	より淡緑	淡緑	やや淡緑	緑	やや濃緑	濃緑	より濃緑	極濃緑	代表的な葉色
9	葉幅	10株	測定	cm (小数第2位を四捨五入)									最大葉の葉幅	
10	葉柄の長さ	10株	測定	cm (小数第2位を四捨五入)									最大葉の葉柄の付根から葉身基部まで	
11	葉面の平滑度	10株	観察				平滑	やや平滑	中	やや凹凸	凹凸			代表的な葉の葉面の平滑度
12	花色	10株	観察				白		淡紫		紫			代表的な花の色
13	花の大きさ	10株	観察		極小	より小	小	やや小	中	やや大	大	より大	極大	代表的な花の大きさ
14	花柄の長さ	10株	観察		極短	より短	短	やや短	中	やや長	長	より長	極長	代表的な花柄の長さ
15	葯の色	10株	観察				クリーム		淡紫		紫			代表的裂開期の葯の色
16	成熟果の果色	10果	観察				黄		オレンジ		赤			代表的成熟果の果色

作物の種類		ピーマン		70(08007)		1次選択項目									
項目番号	項目名	調査数	方法	分 級 ・ 単 位										調 査 方 法 等	
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
17	花の着生性	10果	観察		1	2	3	4	5					代表的株の1節当たりの着花数	
18	果形	10果	観察		小形 円錐形	だる ま形	円筒 形	細長 形	短く さび形	長く さび形	中長 形	ベル 形	扁平 形	代表的な成熟果の果形	
19	収穫果長	10果	測定	cm (小数第2位を四捨五入)										代表的な果実 (収穫期) の最大長	
20	収穫果径	10果	測定	cm (小数第2位を四捨五入)										代表的な果実 (収穫期) の最大径	
21	果肉の厚さ	10果	測定	mm (小数第2位を四捨五入)										代表的な成熟果の果長中央部の果肉の厚さ	
22	心室数	10果	測定		1	2	3	4						代表的な果実の心室数	
23	果のアントシアニン	10果	観察	無	極少	より少	少	やや少	中	やや多	多	より多	極多	低温期の成熟果における発生程度	
24	果の光沢	10果	観察		極弱	より弱	弱	やや弱	中	やや強	強	より強	極強	収穫期の果実の光沢	
25	果面の条溝の深さ	10果	観察	無	極浅	より浅	浅	やや浅	中	やや深	深	より深	極深	成熟期の果実表面の条溝の深さ	
26	果柄の強さ	10果	観察		極弱	より弱	弱	やや弱	中	やや強	強	より強	極強	代表的な果実の果柄の折れに対する強さ	
27	へた離れの難易	10果	観察		極易	より易	易	やや易	中	やや難	難	より難	極難	代表的な果実のへた離れの難易	
28	果皮の硬さ	10果	観察		極軟	より軟	軟	やや軟	中	やや硬	硬	より硬	極硬	代表的な果実の果皮の硬さ	
29	果の辛味	10果	観察	無	極弱	より弱	弱	やや弱	中	やや強	強	より強	極強	代表的果実の辛味発現の程度	
30	着果数	10株	観察		極少	より少	少	やや少	中	やや多	多	より多	極多	株当たり着果数	
31	1果当たり種子数	10果	測定		極少	より少	少	やや少	中	やや多	多	より多	極多	代表的な成熟果の種子数	
32	早晩性	10果	観察		極早	より早	早	やや早	中	やや晩	晩	より晩	極晩	収穫始期の平均	

作物の種類		ピーマン		70(08007)	2次必須項目									
項目 番号	項目名	調査数	方法	分 級 ・ 単 位										調 査 方 法 等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ウイルス病（TMV）抵抗性	10株	観察		極低	より低	低	やや低	中	やや高	高	より高	極高	接種又は自然発病
2	ウイルス病（CMV）抵抗性	10株	観察		極低	より低	低	やや低	中	やや高	高	より高	極高	接種又は自然発病
3	疫病抵抗性	10株	観察		極低	より低	低	やや低	中	やや高	高	より高	極高	接種又は自然発病
4	ハダニ抵抗性	10株	観察		極低	より低	低	やや低	中	やや高	高	より高	極高	自然発生又は接種
5	オンシツコナジラミ抵抗性	10株	観察		極低	より低	低	やや低	中	やや高	高	より高	極高	自然発生又は接種

作物の種類		ピーマン		70(08007)	2次選択項目									
項目 番号	項目名	調査数	方法	分 級 ・ 単 位										調 査 方 法 等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	低温伸長性	10株	観察		極低	より低	低	やや低	中	やや高	高	より高	極高	低温期の伸長の良否
2	耐寒性	10株	観察		極低	より低	低	やや低	中	やや高	高	より高	極高	
3	耐湿性	10株	観察		極低	より低	低	やや低	中	やや高	高	より高	極高	多湿後、湿害の発生程度
4	加温ハウス栽培適応性	10株	観察		極低	より低	低	やや低	中	やや高	高	より高	極高	伸長性・着果性・果実特性等を考察して総合的に判定する

作物の種類		ピーマン		70(08007)	3次選択項目									
項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	辛味の程度	10果	官能検査		極弱	より弱	弱	やや弱	中	やや強	強	より強	極強	代表的な成熟果についてのカプサイシン含量