作物の種類	かぶ	72(08009)	1次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	葉柄・中肋の形	10株	観察				平	やや扁円	扁円	扁円～丸味	丸味			葉の基部よりやや上部で評価
17	側芽枝の有無	10株	観察	無									有	
18	T／R率	10株	測定	%（小数第2位を四捨五入）										
19	抽根性	10株	観察	無	極小	より小	小	やや小	中	やや大	大	より大	極大	
20	根首部の凹凸	10株	観察				凹入	やや凹入	平	やや突出	突出			
21	根肩部の形	10株	観察		張る	張る～なで	なで肩	なで～流れ	流れ	流れ～や徳	やや徳利	や徳～徳利	徳利	
22	根尻部の形	10株	観察		凹入	やや凹入	平	やや丸	丸	つまり	流れ	やや尖り	尖り	
23	根、補充色	10株	観察	無	極淡緑	淡緑	緑	緑～赤	赤	赤～赤紫	赤紫	赤紫～紫	紫	抽根部のみ着色の品種について
24	根、補充色の分布	10株	観察				<1/4	1/2～<1/4	1/2	1/2～<3/4	<3/4			抽根部のみ着色の品種について，着葉部からみた根長に対する割合
25	根の肉色	10株	観察		白	乳白	淡黄	黄	淡緑	淡緑～淡赤	淡赤			
26	肉補充色の分布	10株	観察				少	やや少	中	やや多	多			縦割りで評価
27	根肌の平滑さ	10株	観察				平滑	やや平滑	中	やや粗	粗			
28	根の横しわの有無	10株	観察	無			少	やや少	中	やや多	多			
29	根皮層の厚さ	10株	観察				薄	やや薄	中	やや厚	厚			根の最大横径部横断面の皮層（皮）部分の厚さ

作物の種類	かぶ	72(08009)	1次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	直根の太さ	10株	観察				細	やや細	中	やや太	太			
31	ス入り	10株	観察				早	やや早	中	やや晩	晩			収穫期に達してからのス入りの早晩
32	抽苔性	10株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発生時の抽苔株の多少，発生の早晩で評価

作物の種類	かぶ	72(08009)	2次必須項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	根こぶ病抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発病又は接種検定による抵抗性の程度
2	モザイク病抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発病又は接種検定による抵抗性の程度
3	軟腐病抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発病又は接種検定による抵抗性の程度

作物の種類	かぶ	72(08009)	２次選択項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	密植適応性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			飼料用カブについてのみ、根重についての密植（約1200個体/a）÷標準値（600個体/a）の比で評価
2	晩ぱ適応性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			飼料用カブについてのみ、根重について晩ぱ／標準まき比で評価
3	貯蔵性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			飼料用カブについてのみ、暖地では在圃性、寒地では収穫後の貯蔵性
4	苗立枯病抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発病による抵抗性の程度
5	白さび病抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発病による抵抗性の程度
6	コナガ抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発生による抵抗性の程度
7	キスジノミハムシ抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発生による抵抗性の程度
8	アオムシ抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発生による抵抗性の程度
9	アブラムシ抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発生による抵抗性の程度
10	低温肥大性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			厳冬期のトンネル栽培で評価
11	高温期栽培適応性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			７月中旬まきで評価

作物の種類	かぶ	72(08009)	３次必須項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	根重	10株	測定	g（小数第1位を四捨五入）										1株根重
2	乾物率	10株	測定	%（小数第2位を四捨五入）										飼料用カブについてのみ、根葉を別にして２cm位の線切りにし、寒冷紗の袋に詰め、初め50℃、後80℃で乾燥する
3	糖度	10株	測定	%（小数第2位を四捨五入）										飼料用カブについてのみ、根葉を別にして２cm位の線切りにした一部汁液の屈折計糖度パーセント(Brix)
4	肉の硬さ	10株	官能検査				軟	やや軟	中	やや高	硬			5mm程度の厚さに輪切りしたものを歯でかんだ時の抵抗の程度
5	肉の緻密さ	10株	官能検査				粗	やや粗	中	やや密	密			5mm程度の厚さに輪切りしたものを歯でかんだ時の歯切れの良さで評価

作物の種類	かぶ	72(08009)	3次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	浅漬け適性	10株	官能検査	無									有	
2	食味	10株	官能検査				劣	やや劣	中	やや優	優			