作物の種類	つけな	73(08010)	1次必須項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	草姿	10株	観察				立	やや立	中	やや開	開			
2	葉形	10株	観察		披針	倒披針	へら	卵	倒卵	長楕円	短楕円	円	広円	切れ込みのあるものはそのふちをなぞった形，葉柄は除く。托葉・小葉部分は葉柄とみなす
3	葉色	10株	観察		淡黄	淡緑～淡黄	淡緑	やや淡緑	緑	やや濃緑	濃緑	濃緑～黒緑	黒緑	
4	葉面の着色	10株	観察	無	極淡	より淡	淡	やや淡	中	やや濃	濃	より濃	極濃	アントシアニンによる着色の程度
5	葉縁の特性	10株	観察		全縁	波状縁	浅裂	やや浅裂	中裂	やや深裂	深裂	より深裂	全裂	
6	葉柄・中肋の幅	10株	観察		極狭	より狭	狭	やや狭	中	やや広	広			最大部
7	葉数	10株	観察				少	やや少	中	やや多	多			分けつ形のものを除く，収穫時の葉数

作物の種類	つけな	73(08010)	1次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	葉の長さ	10株	測定	cm（小数第1位を四捨五入）										最大葉長
2	裂縁の多少	10株	観察	無	極少	より少	少	やや少	中	やや多	多	より多	極多	
3	裂縁の太さ	10株	観察				細	やや細	中	やや太	太			
4	鋸歯の多少	10株	観察	無	極少	より少	少	やや少	中	やや多	多			
5	葉の光沢	10株	観察				弱	やや弱	中	やや強	強			
6	葉のろう質	10株	観察				少	やや少	中	やや多	多			
7	葉面の毛茸	10株	観察	無	極少	より少	少	やや少	中	やや多	多			
8	葉面の波打ち	10株	観察	無	極少	より少	少	やや少	中	やや多	多			
9	小葉の多少	10株	観察	無	極少	より少	少	やや少	中	やや多	多			
10	葉肉の厚さ	10株	観察				薄	やや薄	中	やや厚	厚			
11	葉柄・中肋の厚さ	10株	観察				薄	やや薄	中	やや厚	厚			縦割りしてみる
12	葉柄・中肋の形	10株	観察				扁平	やや扁平	中	やや半円状	半円状	半円～円	円	
13	葉柄・中肋の筋	10株	観察				少	やや少	中	やや多	多			
14	葉柄・中肋のねじれ	10株	観察	無	極僅	より僅	僅	やや僅	中	やや激	激			
15	葉柄・中肋の色	10株	観察		白	極淡緑	淡緑	やや淡緑	緑	やや淡紫	淡紫	紫	濃紫	背側でみる

作物の種類	つけな	73(08010)	1次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	葉柄の長さ	10株	観察	無	極短	より短	短	やや短	中	やや長	長			3:葉長の1/4, 5:同2/4, 7:同3/4
17	葉柄の重なり	10株	観察				少	やや少	中	やや多	多			
18	葉柄・中肋基部の幅	10株	観察		極狭	より狭	狭	やや狭	中	やや広	広			
19	分けつ性	10株	観察	無									有	
20	主根の肥大性	10株	観察	無	極小	より小	小	やや小	中	やや大	大			
21	生育の早晩性	10株	観察				早	やや早	中	やや晩	晩			japonica, pekinensis, chinensis, rapa, parachinensis, brasica junceaの各分類ごとに標準品種を設けて比較する
22	結球性	10株	観察	無									有	９＝半結球
23	抽苔性	10株	観察				早	やや早	中	やや晩	晩			茎葉を利用するものについてのみ調査
24	抽苔の草姿	10株	観察				立	やや立	中	やや開	開			花蕾（含茎）を利用するものについて
25	分枝性	10株	観察				少	やや少	中	やや多	多			花蕾（含茎）を利用するものについて
26	花茎の色	10株	観察				淡緑	やや淡緑	緑	やや濃緑	濃緑			花蕾（含茎）を利用するものについて，アントシアニンによる着色
27	花茎の太さ	10株	観察				細	やや細	中	やや太	太			花蕾（含茎）を利用するものについて，第１次分枝の太さ
28	花蕾の色	10株	観察				淡緑	やや淡緑	緑	やや濃緑	濃緑			花蕾（含茎）を利用するものについて，個々の雷の集合として評価
29	花蕾の着色	10株	観察				淡	やや淡	中	やや濃	濃			花蕾（含茎）を利用するものについて，アントシアニンによる着色を評価
30	側花蕾の大きさ	10株	観察				小	やや小	中	やや大	大			花蕾（含茎）を利用するものについて

作物の種類	つけな	73(08010)	2次必須項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	根こぶ病抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発病または接種検定による抵抗性の程度
2	軟腐病抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発病または接種検定による抵抗性の程度
3	ウイルス病抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発病または接種検定による抵抗性の程度

作物の種類	つけな	73(08010)	２次選択項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	べと病抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発病又は接種検定による抵抗性の程度
2	黄化病抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発病又は接種検定による抵抗性の程度
3	コナガ抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発生による抵抗性の程度
4	アブラムシ抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発生による抵抗性の程度
5	アオムシ抵抗性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			自然発生による抵抗性の程度
6	耐寒性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			寒さに対する生育の障害程度で評価
7	耐暑性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			暑さに対する生育の障害程度で評価
8	高温期栽培適応性	30株	観察				低	やや低	中	やや高	高			高温期栽培における良品生産の難易度で評価

作物の種類	つけな	73(08010)	3次必須項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	全重	10株	測定	g（小数第1位を四捨五入）										一株重
2	辛み	3株	官能検査	無	極弱	より弱	弱	やや弱	中	やや強	強			葉肉を歯でかんだ時の辛み
3	辛子含量	10株	官能検査	無	極少	より少	少	やや少	中	やや多	多			種子を歯でかんだ時の辛みの程度で評価

作物の種類	つけな	73(08010)	3次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	採種量	10株	測定	g/株（小数第1位を四捨五入）										油料用についてのみ調査
2	浅漬適性	10株	官能検査	無									有	
3	食味	10株	官能検査				劣	やや劣	中	やや優	優			