| 作物の種類 | たかな | 76(08015) | 1次必須項目 |
|---|---|---|---|

| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分級・単位 | | | | | | | | | | 調査方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 草姿 | 10株 | 観察 | | | | 立 | やや立 | 中 | やや開 | 開 | | | 収穫期，個体として評価 |
| 2 | 葉形 | 10株 | 観察 | | 披針 | 倒披針 | へら | 卵 | 倒卵 | 長楕円 | 短楕円 | 円 | 広円 | 切れ込みのあるものはそのふちをなぞった形，葉柄は除く（托葉･小葉部分は葉柄とみなす） |
| 3 | 葉色 | 10株 | 観察 | | 淡黄 | 淡緑～淡黄 | 淡緑 | やや淡緑 | 緑 | やや濃緑 | 濃緑 | 濃緑～黒緑 | 黒緑 | |
| 4 | 葉面の着色 | 10株 | 観察 | 無 | 極淡 | より淡 | 淡 | やや淡 | 中 | やや濃 | 濃 | | | アントシアニンによる着色の程度 |
| 5 | 葉縁の特性 | 10株 | 観察 | | 全縁 | 浅裂～全縁 | 浅裂 | 中裂～浅裂 | 中裂 | 中裂～深裂 | 深裂 | 深裂～全裂 | 全裂 | |
| 6 | 葉柄・中肋の幅 | 10株 | 観察 | | 極狭 | より狭 | 狭 | やや狭 | 中 | やや広 | 広 | | | 最大部 |
| 7 | 葉数 | 10株 | 観察 | | | | 少 | やや少 | 中 | やや多 | 多 | | | 分けつ型のものを除く |

| 作物の種類 | たかな | 76(08015) | 1次選択項目 |
|---|---|---|---|

| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分級・単位 | | | | | | | | | | 調査方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 葉の長さ | 10株 | 観察 | | | | 短 | やや短 | 中 | やや長 | 長 | | | 最大葉 |
| 2 | 裂縁の多少 | 10株 | 観察 | 無 | 極少 | より少 | 少 | やや少 | 中 | やや多 | 多 | より多 | 極多 | |
| 3 | 裂縁の太さ | 10株 | 観察 | | | | 細 | やや細 | 中 | やや太 | 太 | | | |
| 4 | 鋸歯の多少 | 10株 | 観察 | 無 | 極少 | より少 | 少 | やや少 | 中 | やや多 | 多 | | | |
| 5 | 葉の光沢 | 10株 | 観察 | | | | 弱 | やや弱 | 中 | やや強 | 強 | | | |
| 6 | 葉のろう質 | 10株 | 観察 | | | | 少 | やや少 | 中 | やや多 | 多 | | | |
| 7 | 葉面の毛茸 | 10株 | 観察 | 無 | 極少 | より少 | 少 | やや少 | 中 | やや多 | 多 | | | |
| 8 | 葉面の波打ち | 10株 | 観察 | 無 | 極少 | より少 | 少 | やや少 | 中 | やや多 | 多 | | | |
| 9 | 小葉の多少 | 10株 | 観察 | 無 | 極少 | より少 | 少 | やや少 | 中 | やや多 | 多 | | | |
| 10 | 葉肉の厚さ | 10株 | 観察 | | | | 薄 | やや薄 | 中 | やや厚 | 厚 | | | |
| 11 | 葉柄・中肋の厚さ | 10株 | 観察 | | | | 薄 | やや薄 | 中 | やや厚 | 厚 | | | 最大部，縦割りでみる |
| 12 | 葉柄・中肋の形 | 10株 | 観察 | | | | 扁平 | やや扁平 | 中 | やや半円状 | 半円状 | | | 最大部 |
| 13 | 葉柄・中肋の筋 | 10株 | 観察 | | | | 少 | やや少 | 中 | やや多 | 多 | | | |
| 14 | 葉柄・中肋のねじれ | 10株 | 観察 | 無 | | | 僅 | やや僅 | 中 | やや激 | 激 | | | |
| 15 | 葉柄・中肋の色 | 10株 | 観察 | | 白 | 極淡緑 | 淡緑 | やや淡緑 | 緑 | やや淡紫 | 淡紫 | 紫 | 濃紫 | 葉柄，中肋の背側でみる |

| 作物の種類 | たかな | 76(08015) | 1次選択項目 |
|---|---|---|---|

| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分級・単位 | | | | | | | | | | 調査方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 16 | 葉柄の長さ | 10株 | 観察 | 無 | 極短 | より短 | 短 | やや短 | 中 | やや長 | 長 | | | |
| 17 | 葉柄の重なり | 10株 | 観察 | | | | 少 | やや少 | 中 | やや多 | 多 | | | |
| 18 | 葉柄・中肋基部の幅 | 10株 | 観察 | | 極狭 | より狭 | 狭 | やや狭 | 中 | やや広 | 広 | | | |
| 19 | 分けつ性 | 10株 | 観察 | 無 | | | | | | | | | 有 | |
| 20 | 主根の肥大性 | 10株 | 観察 | 無 | 極小 | より小 | 小 | やや小 | 中 | やや大 | 大 | | | |
| 21 | 早晩性 | 10株 | 観察 | | | | 早 | やや早 | 中 | やや晩 | 晩 | | | 生育の早晩性 |
| 22 | 抽苔性 | 10株 | 観察 | | | | 早 | やや早 | 中 | やや晩 | 晩 | | | 自然発生の多少，早晩で評価 |
| 23 | 結球性 | 10株 | 観察 | 無 | | | | | | | | | 有 | |

| 作物の種類 | たかな | 76(08015) | 2次必須項目 |
|---|---|---|---|

| 項目番号 | 項　目　名 | 調査数 | 方法 | 分　級　・　単　位 | | | | | | | | | | 調　査　方　法　等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 根こぶ病抵抗性 | 30株 | 観察 | | | | 低 | やや低 | 中 | やや高 | 高 | | | 自然発病又は接種検定による抵抗性の程度 |
| 2 | 軟腐病抵抗性 | 30株 | 観察 | | | | 低 | やや低 | 中 | やや高 | 高 | | | 自然発病又は接種検定による抵抗性の程度 |
| 3 | ウィルス病抵抗性 | 30株 | 観察 | | | | 低 | やや低 | 中 | やや高 | 高 | | | 自然発病又は接種検定による抵抗性の程度 |

| 作物の種類 | たかな | 76(08015) | 2次選択項目 |
|---|---|---|---|

| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分級・単位 | | | | | | | | | | 調査方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | べと病抵抗性 | 30株 | 観察 | | | | 低 | やや低 | 中 | やや高 | 高 | | | 自然発病又は接種検定による抵抗性の程度 |
| 2 | 黄化病抵抗性 | 30株 | 観察 | | | | 低 | やや低 | 中 | やや高 | 高 | | | 自然発病又は接種検定による抵抗性の程度 |
| 3 | コナガ抵抗性 | 30株 | 観察 | | | | 低 | やや低 | 中 | やや高 | 高 | | | 自然発生による抵抗性の程度 |
| 4 | アブラムシ抵抗性 | 30株 | 観察 | | | | 低 | やや低 | 中 | やや高 | 高 | | | 自然発生による抵抗性の程度 |
| 5 | アオムシ抵抗性 | 30株 | 観察 | | | | 低 | やや低 | 中 | やや高 | 高 | | | 自然発生による抵抗性の程度 |
| 6 | 耐寒性 | 30株 | 観察 | | | | 低 | やや低 | 中 | やや高 | 高 | | | 寒さに対する生育の障害程度で評価 |
| 7 | 耐暑性 | 30株 | 観察 | | | | 低 | やや低 | 中 | やや高 | 高 | | | 暑さに対する生育の障害程度で評価 |
| 8 | 高温期栽培適応性 | 30株 | 観察 | | | | 低 | やや低 | 中 | やや高 | 高 | | | 高温期栽培における良品生産の難易で評価 |

| 作物の種類 | たかな | 76(08015) | 3次必須項目 |
|---|---|---|---|

| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分級・単位 | | | | | | | | | | 調査方法等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 全重 | 10株 | 観察 | | | | 小 | やや小 | 中 | やや大 | 大 | | | 一株重 |
| 2 | 辛み | 3株 | 官能検査 | 無 | 極弱 | より弱 | 弱 | やや弱 | 中 | やや強 | 強 | | | 生食の際の辛みの程度 |
| 3 | 辛子含量 | 10株 | 官能検査 | | | | 少 | やや少 | 中 | やや多 | 多 | | | 生食の際の辛みの程度で評価 |

| 作物の種類 | たかな | 76(08015) | 3次選択項目 |
|---|---|---|---|

| 項目番号 | 項　目　名 | 調査数 | 方法 | 分　級　・　単　位 | | | | | | | | | | 調　査　方　法　等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 種子の辛味 | 10株 | 官能検査 | 無 | | | 弱 | やや弱 | 中 | やや強 | 強 | | | |
| 2 | 浅漬け適性 | 10株 | 官能検査 | 無 | | | | | | | | | 有 | |
| 3 | 食味 | 10株 | 官能検査 | | | | 劣 | やや劣 | 中 | やや優 | 優 | | | |